

Пояснения:

к сожалению, в настоящее время многие гос. Ветлечебницы не обладают полной информацией о новых препаратах зарубежного производства. Отечественные препараты и их аналоги прошлых лет, сняты с производства или давно устарели, эффекта от них мало. К некоторым препаратам у животных выработался иммунитет и они малоэффективны. Внизу каждого раздела смотрите сноску "препараты, используемые сегодня". Думаем, это даст вам полную картину и понятие заболевания с его лечением.

К паразитарным - относят заболевания, возникновение которых вызывают паразитические гельминты, простейшие, клещи и насекомые. Животные повсеместно встречаются с самыми различными паразитами, но последние не всегда внедряются в организм хозяина и развиваются в нем, т. е. не всегда наступает инвазия. Для ее возникновения необходимы соответствующие условия (возраст, восприимчивость, упитанность животного-хозяина и соответствующая стадия развития паразита). В зависимости от принадлежности паразитов к той или другой зоологической группе инвазионные болезни подразделяются на:

- гельминтозы (вызываются паразитическими червями-гельминтами),
- протозоозы (вызываются простейшими),
- арахнозы (вызываются паукообразными),
- энтомозы (вызываются насекомыми).

Псороптоз (чесотка)

Это хроническое заболевание вызывает клещ. Повреждая кожу, вызывает вначале зуд, затем различные воспаления кожи, выпадение шерстного покрова.

Из-за сильного раздражения кожи животные бес-покоятся, у них пропадает аппетит, наступает истощение. Наиболее тяжело чесотка у овец протекает осенью и зимой.

Против клещей овец обрабатывают инсектоакарицидами в форме порошков (дуст гексахлорана-6- 12%, никохлоран-0,1 % эмульсия). Для этого шерсть на пораженных и соседних с ними участках выстригают. Остриженные места промывают теплой водой с мылом. Удаляют корочки и чешуйки, соскабливая их деревянным ножом. На кожу животных наносят лечебный порошок, соблюдая меры предосторожности, чтобы

препарат не попал на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Работу проводят в резиновых перчатках. Порошок насыпают в спринцовку или марлевые мешочки и посыпают кожу животного, раздвигая шерсть. Для лечения в большинстве случаев бывает достаточно одной обработки, при необходимости обрабатывают повторно через 10 дней. Овец можно обрабатывать не ранее чем за 2 месяца до убоя.

Малотоксичное для животных мыло К. Против клещей применяют 4-6% свежеприготовленную водную эмульсию (4-6 г мыла на 100 г воды). Пораженные места кожи очищают и обмывают теплой водой с мылом. Можно и купать овец в этом растворе. [Абивертин](#) широкого спектра действия. Применяют против псороптоза (чесотки) и клещей. [Ивертин](#) (Ivertinum) лекарственное средство для лечения паразитарных болезней животных.

Фасциолез

Возбудителем фасциолеза является плоский листовидный червь - фасциола, паразитирующий в желчных протоках печени. Заражение происходит на пастбищах через экскременты больных животных.

При остром течении (чаще бывает осенью) возникает воспаление печени, заканчивающееся смертью. При хроническом течении наблюдаются расстройство пищеварения, истощение, слабость, животные часто ложатся, шерсть становится сухой, ломкой. Появляется отечность в области век, подбородка, груди, живота, отмечаются запоры и поносы. При подозрении на заболевание кал нужно направлять в ветлабораторию для исследования на яйца фасциол.

Для дегельминтизации применяют препараты: гексахлорпарахлорид, четыреххлористый углерод, гексахлорэтан, филиксан, битионол. Лечение животных проводят под наблюдением ветеринарного специалиста.

Для предупреждения фасциолеза не следует выпасать овец на низменных заболоченных участках; поить животных из стоячих водоемов, болот, луж, мелких прудов, где могут обитать промежуточные хозяева фасциол - малые прудовики; скашивать траву на болотистых лугах. Сено с неблагополучных по фасциолезу пастбищ можно скармливать овцам во второй половине стойлового периода, т. е. через 6 месяцев после уборки. Желательно каждый год менять пастбища.

В стойловый период нужно проводить дегельминтизацию овец четыреххлористым углеродом: первый раз - осенью, сразу после перехода на стойловое содержание; второй раз весной, за 2-4 недели до выгона на пастбище. Дегельминтизируют животных старше 6 месячного возраста.

В настоящее время используют [Альбен](#).

Диктиокаулез

Заболевание вызывается гельминтом нитевидной формы, паразитирующим в дыхательных путях овец. Наиболее распространено заболевание весной и осенью.

Первая стадия: извращение аппетита, усиление перистальтики, понос, болезненность в брюшной области, в кале обнаруживаются частицы не переваренного корма, а иногда и кровь. С развитием заболевания начинают преобладать нарушения в органах дыхания. Вначале появляется редкий, слабый кашель, затем он усиливается, особенно по ночам. В это время из ноздрей начинают выделяться гнойные истечения, дыхание учащается. Животные много лежат, быстро худеют.

В запущенных случаях осложняется пневмонией. При убое в трахее и бронхах находят скопления нитевидного возбудителя белого цвета, пенистую жидкость.

Для лечения овец применяют водный раствор йода, дитразина цитрат, дитразин ветеринарный, локсуран, циазоп. Лечение животных должен проводить ветеринарный специалист. Профилактика должна быть направлена на рациональную пастьбу овец. Ягнят после отбивки лучше пастить на отдельных участках, которые не использовались в текущем году под выпас взрослых животных.

Для предупреждения заражения дают препарат циазон один раз в сутки в течение трех дней подряд.

С целью химиопрофилактики ежедневно скармливают овцам и козам смесь, состоящую из одной части фенотиазина и девяти частей кормовой соли, а при пастбище на солончаковых - смесь в соотношении 1:6.

В настоящее время используют [Альбен](#) .

Мониезиоз

Возбудитель заболевания - ленточный глист, паразитирующий в тонком отделе кишечника. Заболевание регистрируется, как правило, у молодняка до 8 месячного возраста через месяц после выгона на пастбище.

Признаки заболевания: потеря аппетита, вялость, задержка в развитии, понос, исхудание. На хвосте и шерстном покрове задней части тела остаются высохшие комки каловых масс. В фекалиях часто можно обнаружить членики гельминта. Наблюдаются судороги, шаткая походка, ложная вертячка.

Для лечения и профилактики рекомендуют использовать фенасал, олова арсенат, марганца арсенат, кальция арсенат и медь углекислую.

Одним из лучших методов профилактики мониезиозов является дегельминтизация через месяц после выгона на пастбище. В качестве антгельминтиков применяют вышеуказанные препараты. Во всех случаях лечение овец проводит ветеринарный врач.

В настоящее время используют [Альбен](#) .

Ценуроз (вертячка)

Возбудителем заболевания является личиночная стадия гельминта, который во взрослом состоянии достигает 3 м. Поражаются в основном молодые овцы. Паразитирует червь в тонком отделе кишечника собак и с их экскрементами попадает на траву, в воду. Личинки в основном проникают в головной мозг овец.

Паразитарные заболевания овец

Автор: Administrator

16.02.2012 19:32 - Обновлено 19.04.2012 13:46

Признаки заболевания: вначале пугливость, бесцельные резкие движения, затем движения по кругу, иногда овцы упираются лбом в какой-либо предмет, подолгу стоят с опущенной головой.

Эффективных мер лечения не разработано.

В целях профилактики заболевания овец необходимо проводить дегельминтизацию собак.

Приусадебное овцеводство. И.В.Киселёв.