ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Альвет (Alvet) - антигельминтное лекарственное средство. Синонимы: Вермитан, Альбен.

В своем составе в качестве действующего вещества препарат содержит альбендазол (200г в 1 кг), а также наполнитель (лактозу).

Препарат по внешнему виду представляет собой гранулы светло-серого цвета, нерастворимые в воде.

Альвет выпускают расфасованным по 50, 100, 250, 500 и 1000 г в полиэтиленовых пакетах, полимерных банках или ведрах, а также крафт-мешках или полимерных ведрах по 12,5 кг.

Каждую упаковку маркируют с указанием наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака и адреса, названия препарата, названия и содержания действующего вещества, способа применения, номера серии, срока годности, условий хранения, массы нетто, надписи "Для животных" и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Альвет в заводской упаковке с предосторожностью (список Б), в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0 °С до 25 °С. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения-2 года со дня изготовления.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Альвет обладает широким спектром антигельминтного действия, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а также половозрелых трематод. Обладая овоцидным действием, снижает зараженность гельминтами пастбищ,

Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в нарушении процессов транспорта глюкозы, микротубулярной функции и снижении

активности фумарат редуктазы у гельминтов, что приводит к их гибели.

При пероральном введении препарата альбендазол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; из организма выводится в основном с мочой и фекалиями.

Альвет по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает гепатотоксическим и сенсибилизирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Альвет назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, лошадям, собакам и сельскохозяйственной птице при нематодозах, грематодозах, цестодозах.

Альвет назначают без предварительной голодной диеты, индивидуально или групповым способом в смеси с концентрированными кормами крупному рогатому скоту, овцам, свиньям и собакам однократно, птице двукратно.

Крупному рогатому скоту препарат применяют индивидуально в следующих дозах:

- при мониезиозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах 3,75 г на 100 кг массы животного (7,5 мг/кг альбендазола);
- при хроническом фасциолезе - 5,0 г на 100 кг массы животного (10 мг/кг альбендазола).

Овцам препарат применяют индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

- при мониезиозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах-2,5 г на 100 кг массы животного (5 мг/кг альбендазола);
- при хроническом фасциолезе - 3,75 г на 100 кг массы животного (7,5 мг/кг альбендазола);

- при хроническом дикроцелиозе - 7,5 г на 100 кг массы животного (15 мг/кг альбендазола).

При групповом способе применения навеску Альвета, рассчитанную на группу не более 150 овец, тщательно смешивают с комбикормом (из расчета 50-100 г комбикорма на животное). Смесь раскладывают в кормушки, обеспечивая животным свободный доступ к ним.

Свиньям препарат применяют при нематодозах групповым способом с концентрированными кормами в утреннее кормление в дозе 5,0 г на 100 кг массы животного (10 мг/кг альбендазола).

половиной нормы корма и раскладывают по кормушкам, обеспечивая животным свободный доступ к ним.

Лошадям препарат назначают при параскаридозе, стронгилятозе, альфортиозе, делафондиозе, аноплцефалезе и цитостомозах индивидуально в дозе 3,75 г на 100 массы животного (7,5 мг/кг альбендазола).

Собакам препарат применяют индивидуально при нематодозах в дозе 0.375 г на 10 кг массы животного (7,5 мг/кг альбендазола); при цестодозах в дозе 0,75 г на 10 кг массы животного (15 мг/кг альбендазола).

Птице препарат применяют при аскаридиозе и гетеракидозе два дня подряд, групповым способом в смеси с комбикормом в утреннее кормление, в дозе 0,5 г на 10 кг массы птицы (10 мг/кг альбендазола).

Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов). При отсутствии в течении 3 суток осложнений приступают к обработке всего поголовья.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

Альвет не разрешается применять при остром фасциолезе, во время случного периода, больным инфекционными болезнями и истощенным животным; свиньям и собакам в первую половину беременности, коровам и кобылам в первую треть беременности, а также курам-несушкам.

Убой на мясо крупного рогатого скота, овец, лошадей и свиней разрешается не ранее, чем через 20 суток, птицы - не ранее, чем через 5 суток после дегельминтизации. В случае вынужденного убоя животных ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм зверям или для переработки на мясо костную муку.

Молоко дойных животных может быть использовано в пищевых целях не ранее, чем через 4 суток после дегельминтизации. Молоко, полученное до истечения указанного срока, может быть использовано после термической обработки в корм животным.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.

Альвет по истечении срока годности не должен применяться.

Альвет следует хранить в местах, недоступных для детей и животных.