Причинами выкидыша могут быть:

1. Плохое кормление и водопой; Авитаминозы и гиповитаминозы чаще всего наблюдаются у ягнят, взрослые овцы меньше подвержены этим заболеваниям. Болезнь возникает от недостатка в кормах витаминов А, В, С, О, Е или их комплекса. В результате ягнята начинают отставать в росте, у них отмечаются признаки нервного расстройства (шатающаяся походка, круговые движения, параличи конечностей и др.). У взрослых овец недостаток витаминов является причиной яловости и бесплодия, ненормального развития плода и рождения слабого ягненка. Заболевание может привести к выкидышу или рождению мертвого ягненка. Поэтому важно обеспечить овец кормами, богатыми витаминами (хорошее сено, веники, зеленый корм, корнеплоды и др.). При недостатке витамина А животным скармливают концентрат витамина А и витаминизированный рыбий жир, при недостатке витаминов группы В - отруби, проросшее зерно, морковь. Если имеются признаки рахита (недостаток витамина О), в рацион вводят рыбий жир, свежее молоко. Больных овец обязательно выпускают на прогулку на свежий воздух. Можно облучать животных и корма (рыбий жир, молоко) кварцевой лампой.

2.Механические воздействия;

3.Инфекционные заболевания. Основными причинами, вызывающими выкидыши, являются гнилые и промерзлые корма, а также поение очень холодной водой, особенно во второй период суягности. По этой же причине нельзя пасти суягных маток по траве, покрытой инеем, изморозью и т. д. Выкидыши под влиянием механических причин обусловливаются ударами, сильной гонкой овец, скучиваньем в узких и тесных проходах, сильным надавливанием на овцу во время стрижки и т. д. Самым опасным является заразный выкидыш, причиной которого может быть внедрение в организм животного специфических микроорганизмов. Инфекция передается через корм, во время случки, когда баран покрывает больных, а затем здоровых маток. Болезнь причиняет большие убытки, поэтому необходимы предохранительные меры до появления заразного выкидыша и весьма решительные меры борьбы при его появлении. При этом необходимо тщательно изолировать больных маток от здоровых. Матку, у которой произошел выкидыш, необходимо лечить, а плод и подстилку необходимо уничтожить: сжечь или глубоко закопать, предварительно залив жидкой известью. Помещение, оборудование и т. д. необходимо также продезинфицировать.

Приусадебное овцеводство. И.В.Киселёв.